

PNV 2012

Quadro II - Vacinação universal. Esquema Recomendado

| Vacina contra: | Idades | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| | 0 Nascimento | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 5-6 anos | 10-13 anos | Toda a vida 10/10 anos |
| Tuberculose | BCG | | | | | | | | |
| Hepatite B | VHB 1 | VHB 2 | | VHB 3 | | | | | |
| Haemophilus influenzae b | | Hib 1 | Hib 2 | Hib 3 | | Hib 4 | | | |
| Difteria -Tétano - Tosse Convulsa | | DTP _a 1 | DTP _a 2 | DTP _a 3 | | DTP _a 4 | DTP _a 5 | Td | Td |
| Poliomielite | | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | | | VIP 4 | | |
| Meningococo C (a) | | | | | MenC 1 | | | | |
| Sarampo - Parotidite epidémica - Rubéola | | | | | VASPR 1 | | VASPR 2 | | |
| Infeções por vírus do Papiloma humano (b) | | | | | | | | HPV 1; 2; 3 13 anos | |

(a) À data de entrada em vigor do PNV 2012, apenas se recomenda 1 dose de MenC aos 12 meses. No período de transição, as crianças que já tenham 1 dose de MenC no 1º ano de vida, necessitam apenas da dose aos 12 meses. Independentemente do número de doses (uma ou duas) efectuadas no primeiro ano de vida, é necessária a dose dos 12 meses (respeitando sempre o intervalo mínimo entre doses).

(b) Aplicável apenas a raparigas.